

MEPITEL FILM

Zuzana Jurišová

Masarykův onkologický ústav

Mail: zjurisova@mou.cz

MEPITEL FILM

- prevence kožních reakcí od prvního dne radioterapie a 2-4 týdny po ozařování

Výhody - snižuje vznik vlhké deskvamace

- tenká transparentní fólie
- přizpůsobí se všem tvarům těla
- chrání pokožku před třením
- voděodolný
- bariéra proti virům a bakteriím

MEPITEL FILM



SafetaC
TECHNOLOGY

MEPITEL FILM

Vhodný při radioterapii na oblast

- prsu
- hrudní stěny
- krku

Je nutné schválení revizním lékařem.

Schvalování trvá 3-4 týdny.

Na doporučení radiačního onkologa při konzultaci radioterapie posoudí i vhodnost aplikace preventivní fólie.

Kazuistika 1

- Č. L. 1964
- po ME l. sin.
- po 4 cyklech CHT
- adj. RT hrudní stěny + LU vlevo
- RT 15.7.-20.8.2015
- Dávka 25x2 Gy (50 Gy)



1. týden RT

Kazuistika 1



3. týden RT



Zastřižená odlepující se fólie

Kazuistika 1



4. týden RT



4. týden RT

Kazuistika 1



14 dní po RT



14. dní po RT

Kazuistika 2

- V.S. 1950
- po parciální ME l. sin.
- nasazena HT na 7-8 let
- adj. RT na oblast lůžka tumoru – elektrony
- RT 27. 1.-1. 3. 2016
- Dávka 25x2 Gy (50 Gy)



v den zahájení RT

Kazuistika 2



1. týden RT, nalepeno 7 dnů



2. týden RT

Kazuistika 2



3. týden RT



V den ukončení RT


Kazuistika 2



3 dny po RT

Kazuistika 3

- MZ 1950
- Po parc. ME l.sin. + reresekce pozit. okraj
- Adj. RT levého prsu
- Adj. HT 5-7 let
- RT 15. 2.-11. 3. 2016
- Dávka 25x2 Gy (50 Gy)
- Boost neaplikován, GYN operace



Kazuistika 3



první nalepení fólie



Po 2 dnech

Kazuistika 3



1. týden RT




Po 5
dnech

Kazuistika 3




2. týden RT

Kazuistika 3



24. frakce RT - deskvamace

Kazuistika 3



5 dní po RT



fólie ponechána - mepilex lite

Kazuistika 3



8 dní po RT mepilex lite



8 dní po RT flamigel

Kazuistika 3




10 dní po RT



10 dní po RT

Kazuistika 3



5 týdnů po RT



5 týdnů po RT

Kazuistika 4

- KA 1951
- inflammatorní ca mammae l. dx
- stp. CHT 12x týdně
- kurat. RT prsu l. dx. + svodné lymfat. oblasti
- 1 cm bolus na kůži
- Dávka 25x2 Gy prso+LU
- 8-10x2 Gy prso



Kazuistika 4



3. týden RT



3. týden RT

Kazuistika 4



5. týden RT

5. týden RT

Kazuistika 4



5. týden RT



pálení pod prsem - mepilex lite

Kazuistika 4



6. týden RT



Mepilex lite á 2 dny

Kazuistika 4



25. frakce RT přerušena

Kazuistika 4



10 dní přerušené RT

Kazuistika 4



RT -14 dní přerušena



10 frací po 2 Gy, celkem 70Gy

Kazuistika 4



3 dny po ukončené RT

Kazuistika 4



10 dní po RT

Kazuistika 4



14 dní po RT

Kazuistika 4



21 dní po RT



Kazuistika 5

- BB 1959
- TU hypofaryngu T4N2bM0
- Nízce diferencovaný spinocelulární karcinom – inoperabilní
- Konkomitantní RT + CHT
- Technika SIB celková dávka 69,96 Gy
- CHT 3 aplikace – hematologická toxicita




zahájení léčby

Kazuistika 5



po 2 dnech



Kazuistika 5



10 frakce RT

Kazuistika 5



15 frakce RT

Kazuistika 5



20 frakce RT



ponecháno 14 dní

Kazuistika 5



20 frakce RT

Kazuistika 5



5 týden RT

Kazuistika 5



6 týden RT

Kazuistika 5



6 týden RT

Kazuistika 5



2 dni po RT



4 dni po RT

Kazuistika 5



8 dní po RT

Kazuistika 5



16 dní po RT

Závěr

- Mepitel film



- bez Mepitel filmu



Děkuji za pozornost.

